

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Route de la FORÊT - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 70.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 198 (Edition Générale N° 10 du 12 Mai 1981)

VIGNE

MILDIOU

La dernière période à fortes précipitations a été favorable aux contaminations en particulier la journée du 9 Mai. On s'attend donc à de nombreuses sorties de taches à partir de la fin de cette semaine. Un traitement généralisé doit être réalisé dès la prochaine période de beau temps afin de protéger le feuillage avant l'apparition de ces taches

PRODUITS de TRAITEMENT contre le MILDIOU : RECTIFICATIF au BULLETIN n° 197

- * A propos des produits à base de cymoxanile (1) il fallait lire :
 - " En plus des qualités propres aux produits fongicides classiques" au lieu de
 - " En plus des qualités classiques".
- (2) ajouter à la liste des produits la Remiltine F (cymoxanile + mancozèbe + folpel) utilisable à 200 g/hl.

OIDIUM

Ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-mildiou. Quand on utilise des anti-mildiou spécifiques, peu actifs contre le black-rot, il peut être intéressant d'employer Rubigan, dans la lutte contre l'oïdium, en raison de sa très bonne efficacité vis-à-vis du black-rot.

VERS de la GRAPPE

Les vols d'Eudémis et de Cochylis ont commencé dès le 28 Avril et se sont intensifiés le 6 Mai notamment. On prévoit que le niveau des populations de cochylis va continuer à progresser dans la région, surtout avec des périodes de temps humide favorables à ce ravageur. Nous préconisons un traitement curatif sur glomérules en première génération. Il est donc bien trop tôt pour ce type d'intervention.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - OIDIUM

Du fait de l'importance des dernières précipitations, il est nécessaire de renouveler la protection conseillée dans notre bulletin précédent, contre ces maladies dès réception de l'avis.

CARPOCAPSE

Les premières captures ont été enregistrées les 6, 7 et 8 Mai à Chaniers (17), Venours (86), Champbertrand (79). Il est probable que très peu de pontes aient été déposées jusque là. Cependant, dans les zones les plus précoces (Charente-Maritime, Plaine de Niort) un premier traitement peut être réalisé dès maintenant. Cette précaution est particulièrement recommandée dans les vergers où la charge en fruits est faible. Dans les zones les plus tardives, attendre un prochain bulletin.

PUCERONS

Surveiller les vergers, quelques foyers de pucerons verts ayant été observés. Utiliser si nécessaire un aphicide spécifique.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes" :